

# **Transamin**

**Zydus Nikkho Farmacêutica Ltda.**  
**Comprimidos**  
**250 mg**

## **I - IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO**

**TRANSAMIN<sup>®</sup>**

**ácido tranexâmico**

### **APRESENTAÇÕES**

Comprimidos de 250 mg.

Embalagem contendo 12 ou 24 comprimidos.

### **USO ORAL**

### **USO ADULTO E PEDIÁTRICO**

### **COMPOSIÇÃO**

Cada comprimido contém:

ácido tranexâmico ..... 250 mg.

Excipiente (\*) q.s.p. ....1 comprimido.

(\*) excipientes: fosfato de cálcio, amido, álcool polivinílico e estearato de magnésio.

## **II - INFORMAÇÕES AO PACIENTE:**

### **1. PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?**

Transamin<sup>®</sup> é destinado para o controle e prevenção de sangramentos provocados por cirurgias, traumatismos e doenças com tendência a sangramentos. E, também, para o tratamento do angioedema hereditário.

### **2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?**

Transamin<sup>®</sup> preserva a estabilidade dos coágulos sanguíneos e evita que eles se dissolvam. Desta forma, reduz os sangramentos. Em pessoas portadoras de angioedema hereditário, Transamin<sup>®</sup> reduz o número e a severidade das crises.

### **3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Transamin<sup>®</sup> é contraindicado para uso por pessoas que estejam apresentando, no momento, doenças caracterizadas pelo aumento da coagulação, como trombose e embolia, ou pela diminuição da circulação sanguínea, como infarto e isquemias, e por aquelas que tenham alergia aos componentes da fórmula.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres que estejam amamentando sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez ou se está amamentando na vigência do tratamento ou após o seu término.**

#### **4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

##### **Precauções e Advertências**

**Gerais:** Pessoas que já tenham apresentado trombose ou embolia, ou tenham familiares que já apresentaram, devem usar este medicamento com cautela e sob supervisão médica. Não se recomenda o uso deste medicamento para hemorragias causadas por coagulação intravascular disseminada. Pessoas que estejam apresentando sangramento urinário devem usar este medicamento sob supervisão médica, pois os coágulos sanguíneos podem obstruir as vias urinárias. Pessoas que necessitem fazer uso deste medicamento por longos períodos, como os portadores de angioedema hereditário, devem ser periodicamente reavaliadas pelo médico.

**Renais Crônicos:** O ácido tranexâmico é eliminado através de urina. Na insuficiência renal, a eliminação do ácido tranexâmico é diminuída e este tende a se acumular no organismo. Portanto, em pessoas que tenham doenças renais, pode ser necessário o ajuste da dose (vide item Posologia) e o tratamento deve ser sob estrita supervisão médica.

**Idosos:** Não há advertências ou recomendações especiais, sobre o uso deste medicamento em pessoas idosas.

**Grávidas:** Estudos em animais não demonstraram aumento da incidência de danos ao feto. Entretanto, o ácido tranexâmico atravessa a placenta e a experiência com seu uso em mulheres grávidas é pouca. Portanto, este medicamento deve ser usado na gravidez com cautela e sob estrita supervisão médica. Não se recomenda seu uso nos três primeiros meses da gravidez.

**Mulheres amamentando:** Somente uma pequena quantidade do ácido tranexâmico é eliminada no leite materno e, nas doses recomendadas, apresenta pouca possibilidade de efeitos sobre a criança. Mesmo assim, durante a amamentação, este medicamento deve ser usado sob orientação médica.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**Uso criterioso no aleitamento ou na doação de leite humano.**

**O uso deste medicamento no período da lactação depende da avaliação e acompanhamento do seu médico ou cirurgião-dentista.**

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas e/ou que estejam amamentando sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez ou se está amamentando na vigência do tratamento ou após o seu término.**

#### **Interações medicamentosas**

Por via oral, até o momento, não foram observadas interações do ácido tranexâmico com outros medicamentos.

Não é recomendado o uso de bebidas alcoólicas ou fumo, durante o tratamento com este medicamento.

#### **Exames laboratoriais**

Não foram observadas alterações em exames laboratoriais, com o uso do ácido tranexâmico.

#### **Alimentos**

A absorção, o efeito e a eliminação do ácido tranexâmico não são modificados pela alimentação.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.**

#### **5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Transamin<sup>®</sup> deve ser guardado na sua embalagem original. Armazenar em temperatura ambiente (de 15°C a 30°C).

**Número do lote, data de fabricação e prazo de validade: vide embalagem externa.**

**Não use medicamento com prazo de validade vencido.**

**Para sua segurança, mantenha o medicamento na embalagem original.**

#### **Características físicas e organolépticas**

Transamin<sup>®</sup> é um comprimido circular, sem cheiro, de cor branca e com um sulco em um dos lados.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.**

**Caso você observe alguma mudança no aspecto do medicamento que ainda esteja no prazo de validade, consulte o médico ou o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo o medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

## **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Modo de Uso: Os comprimidos de Transamin® devem ser ingeridos com um pouco de água ou qualquer outro líquido, na dose e horários receitados pelo seu médico.

Posologia: A dose de Transamin® deve ser ajustada individualmente por pessoa. As doses aqui recomendadas servem como uma orientação inicial, mas poderão ser modificadas pelo seu médico, de acordo com a sua necessidade.

### **Adultos:**

Sangramento localizado: O tratamento pode ser iniciado com Transamin® injetável. Entretanto, se o tratamento continuar por mais de 3 dias ou em casos de menor gravidade, recomenda-se o uso da apresentação oral, na dose de 15 a 25 mg/kg, isto é, 2 a 3 comprimidos, duas a três vezes ao dia, a critério médico.

### **Crianças:**

De acordo com o peso corporal: 10 mg/kg/dose, duas a três vezes ao dia, a critério médico.

### **Insuficiência Renal:**

Em pessoas com insuficiência renal, para evitar o risco de acúmulo, a dose deve ser corrigida de acordo com a seguinte tabela:

| <b>creatinina sérica</b> | <b>dose oral</b> | <b>frequência</b> |
|--------------------------|------------------|-------------------|
| 120 a 150 micromol/L     | 25 mg/kg         | 2 vezes ao dia    |
| 250 a 500 micromol/L     | 25 mg/kg         | 1 vez ao dia      |
| > 500 micromol/L         | 12,5 mg/kg       | 1 vez ao dia      |

### **Algumas Indicações e Doses Recomendadas para Adultos:**

Cirurgia de próstata – Em pessoas com maior risco para sangramentos, a prevenção e o tratamento da hemorragia devem começar antes da cirurgia, com Transamin® injetável, seguido de 2 comprimidos, três a quatro vezes ao dia, até que o sangramento urinário desapareça.

Sangramento menstrual excessivo – 2 a 3 comprimidos, três a quatro vezes ao dia, por período de três a quatro dias. O tratamento com Transamin® deve ser iniciado logo após o início do sangramento intenso. Nos casos em

que o aumento do fluxo menstrual já é previsto, deve-se iniciar o tratamento no 1º dia da menstruação. Se o fluxo for reduzido a um nível aceitável, sem efeitos colaterais, o tratamento pode ser repetido indefinidamente. Caso não se obtenha redução do sangramento, seu uso não deve continuar por mais do que três ciclos menstruais.

Sangramento nasal – 2 comprimidos, três vezes ao dia, durante 7 dias.

Hemofilia – No preparo de extrações dentárias, 2 a 3 comprimidos, a cada 8 horas.

Angioedema hereditário – 2 a 3 comprimidos, duas a três vezes ao dia, até ser observado o desaparecimento da crise. Entretanto, algumas pessoas podem necessitar de tratamento contínuo, com esta dose.

De modo geral e em todos os casos, a dose máxima diária recomendada é de 12 comprimidos por dia. Entretanto, em algumas situações especiais e sob supervisão médica, esta pode ser aumentada até 18 comprimidos por dia.

**Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.**

**Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.**

## **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Caso você esqueça de tomar Transamin® no horário receitado pelo seu médico, tome-o assim que se lembrar.

Porém, se já estiver próximo ao horário de tomar a dose seguinte, pule a dose esquecida e tome a próxima, continuando normalmente o esquema de doses receitado pelo seu médico. Neste caso, não tome o medicamento duas vezes para compensar a dose esquecida. O esquecimento da dose pode, entretanto, comprometer a eficácia do tratamento.

**Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico ou cirurgião-dentista.**

## **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

### **Reações adversas**

De modo geral, Transamin® é bem tolerado. Entretanto, as reações adversas observadas com o uso do ácido tranexâmico foram:

Reações comuns (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento): náuseas\*, vômitos\*, dor no estômago\* e diarreia\*.

Reações incomuns (ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento): alergia na pele.

Reações raras (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento): tonteira\*, dor de cabeça\*, visão embaçada\*, queda da pressão\* e tromboembolismo\*. Em tratamentos por períodos longos, foi observada, também, dificuldade para identificação das cores\*\*.

(\*) Estas reações adversas aconteceram com o uso de doses mais altas do ácido tranexâmico e desapareceram com a diminuição da dose.

**(\*\*) Informe imediatamente ao seu médico o aparecimento de dificuldade para identificação das cores, pois, nestes casos, o medicamento deve ser suspenso.**

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento.**

**Informe à empresa sobre o aparecimento de reações indesejáveis e problemas com este medicamento, entrando em contato através do Sistema de Atendimento ao Consumidor (SAC).**

### **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Em caso de uso de dose maior do que aquela que lhe foi receitada pelo seu médico, você poderá apresentar náuseas, vômitos, dor no estômago, diarreia, tonteira, dor de cabeça, visão embaçada e queda da pressão. Tente tomar maior quantidade de água, para que maior quantidade do medicamento possa ser eliminada pela urina, e procure seu médico imediatamente.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.**

**Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações sobre como proceder.**

### **III - DIZERES LEGAIS**

Registro: 1.5651.0045

#### **Produzido por:**

**ZYDUS NIKKHO FARMACÊUTICA LTDA.**

Rua Jaime Perdigão, 431/445 – Ilha do Governador

Rio de Janeiro – RJ – BRASIL

C.N.P.J. 05.254.971/0008-58

**INDÚSTRIA BRASILEIRA**

#### **Registrado Por:**

**ZYDUS NIKKHO FARMACÊUTICA LTDA.**

Av. das Américas nº 3434 – BL 07 – salas 502 e 503

Barra da Tijuca – Rio de Janeiro/RJ

CEP: 22.640-102

CNPJ: 05.254.971/0001-81

Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 282 11 27

**INDÚSTRIA BRASILEIRA**

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO**

**Esta bula foi aprovada pela Anvisa em 22/11/2022**





### Histórico de Mudanças de Produto

| Dados da Submissão Eletrônica |                |                                                                                              | Dados da Petição/Notificação que Altera Bula |                |         | Dados das Alterações de Bulas                                                                                                              |                  |                                                                                        |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Data do Expediente            | No. Expediente | Assunto                                                                                      | Data do Expediente                           | No. Expediente | Assunto | Itens de Bula                                                                                                                              | Versões (VP/VPS) | Apresentações relacionadas                                                             |
| 29/12/2025                    | 1653434252     | 10451 -<br>MEDICAMENTO<br>NOVO - Notificação<br>de Alteração de Texto<br>de Bula – RDC 60/12 | -                                            | -              | -       | Apresentações<br>4. O QUE DEVO SABER ANTES DE<br>USAR ESTE MEDICAMENTO?<br>Dizeres Legais                                                  | VP/VPS           | 250 MG COM CT<br>BL AL PLAS<br>TRANS X 12<br>250 MG COM CT<br>BL AL PLAS<br>TRANS X 24 |
| 24/11/2022                    | 4979007228     | 10451 -<br>MEDICAMENTO<br>NOVO - Notificação<br>de Alteração de Texto<br>de Bula – RDC 60/12 | -                                            | -              | -       | VP:<br>5. ONDE, COMO E POR QUANTO<br>TEMPO POSSO GUARDAR ESTE<br>MEDICAMENTO?<br>VPS:<br>7. CUIDADOS DE<br>ARMAZENAMENTO DO<br>MEDICAMENTO | VP/VPS           | 250 MG COM CT<br>BL AL PLAS<br>TRANS X 12                                              |
| 09/08/2022                    | 4525576227     | 10451 -<br>MEDICAMENTO<br>NOVO - Notificação<br>de Alteração de Texto<br>de Bula – RDC 60/12 | -                                            | -              | -       | III – DIZERES LEGAIS                                                                                                                       | VP/VPS           | 250 MG COM CT<br>BL AL PLAS<br>TRANS X 12                                              |
| 01/11/2018                    | 1053142/18-4   | 10451 -<br>MEDICAMENTO<br>NOVO - Notificação<br>de Alteração de Texto<br>de Bula – RDC 60/12 | -                                            | -              | -       | I – IDENTIFICAÇÃO DO<br>MEDICAMENTO<br>III – DIZERES LEGAIS                                                                                | VP/VPS           | 250 MG COM CT<br>BL AL PLAS<br>TRANS X 12                                              |
| 05/11/2013                    | 0931117/13-3   | 10458 -<br>MEDICAMENTO<br>NOVO - Inclusão<br>Inicial de Texto de<br>Bula – RDC 60/12         | -                                            | -              | -       | VERSÃO INICIAL                                                                                                                             | VP/VPS           | 250 MG COM CT<br>BL AL PLAS<br>TRANS X 12                                              |

**Transamin**

**Zydus Nikkho Farmacêutica Ltda.**

**Solução Injetável**

**50mg/mL**

## I - IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

**TRANSAMIN<sup>®</sup>**

**ácido tranexâmico**

### APRESENTAÇÕES

Solução Injetável de 50 mg/mL.

Embalagens contendo 5 ou 100 ampolas com 5 mL.

### USO INTRAVENOSO

### USO ADULTO E PEDIÁTRICO

### COMPOSIÇÃO

Cada ml da solução injetável contém:

ácido tranexâmico ..... 50 mg

veículo\* q.s.p.....1 mL

(\*) excipiente: água para injeção.

## II - INFORMAÇÕES AO PACIENTE:

### 1. PARA QUÊ ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

Transamin<sup>®</sup> é destinado para o controle e prevenção de sangramentos provocados por cirurgias, traumatismos e doenças com tendência a sangramentos. A forma injetável é usada quando se deseja um efeito mais rápido ou mais intenso.

### 2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

Transamin<sup>®</sup> preserva a estabilidade dos coágulos sanguíneos e evita que eles se dissolvam. Desta forma, reduz os sangramentos.

### 3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Transamin<sup>®</sup> é contraindicado para uso por pessoas que estejam apresentando, no momento, doenças caracterizadas pelo aumento da coagulação, como trombose e embolia, ou pela diminuição da circulação sanguínea, como infarto e isquemias, e por aquelas que tenham alergia ao componente da fórmula.

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas e/ou que estejam amamentando sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez ou se está amamentando na vigência do tratamento ou após o seu término.**

#### **4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

##### **Precauções e Advertências**

**Sobre o medicamento:** Transamin<sup>®</sup> injetável só deve ser aplicado pela via endovenosa, isto é, na veia. Não deve ser aplicado pela via intramuscular (*vide item Reações Adversas*). Portanto, pela necessidade de cuidados essenciais para a aplicação endovenosa, recomenda-se que Transamin<sup>®</sup> injetável seja aplicado por profissionais de saúde, em ambiente hospitalar e sob supervisão médica.

**Gerais:** Pessoas que já tenham apresentado trombose ou embolia, ou tenham familiares que já apresentaram, devem usar este medicamento com cautela e sob supervisão médica. Não se recomenda o uso deste medicamento para hemorragias causadas por coagulação intravascular disseminada. Pessoas que estejam apresentando sangramento urinário devem usar este medicamento sob supervisão médica, pois os coágulos sanguíneos podem obstruir as vias urinárias. Pessoas que necessitem fazer uso deste medicamento por longos períodos devem ser periodicamente reavaliadas pelo médico.

**Renais Crônicos:** O ácido tranexâmico é eliminado através de urina. Na insuficiência renal, a eliminação do ácido tranexâmico é diminuída e este tende a se acumular no organismo. Portanto, em pessoas que tenham doenças renais, pode ser necessário o ajuste da dose e o tratamento deve ser sob estrita supervisão médica.

**Idosos:** Não há advertências ou recomendações especiais, sobre o uso deste medicamento em pessoas idosas.

**Grávidas:** Estudos em animais não demonstraram aumento da incidência de danos ao feto. Entretanto, o ácido tranexâmico atravessa a placenta e a experiência com seu uso em mulheres grávidas é pouca. Portanto, este medicamento deve ser usado na gravidez com cautela e sob estrita supervisão médica. Não se recomenda seu uso nos três primeiros meses da gravidez.

**Mulheres amamentando:** Somente uma pequena quantidade do ácido tranexâmico é eliminada no leite materno e, nas doses recomendadas, apresenta pouca possibilidade de efeitos sobre a criança. Mesmo assim, durante a amamentação, este medicamento deve ser usado sob orientação médica.

**Uso criterioso no aleitamento ou na doação de leite humano.**

**O uso deste medicamento no período da lactação depende da avaliação e acompanhamento do seu médico ou cirurgião-dentista.**

**Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas e/ou que estejam amamentando sem orientação médica ou do cirurgião-dentista.**

**Informe ao seu médico a ocorrência de gravidez ou se está amamentando na vigência do tratamento ou após o seu término.**

#### **Interações medicamentosas**

Transamin<sup>®</sup> injetável deve ser aplicado isoladamente. Não deve ser misturado com nenhum outro medicamento, nem aplicado no mesmo equipo em que já esteja sendo aplicado outro medicamento, pois as características de Transamin<sup>®</sup> injetável podem ser modificadas.

Não é recomendado o uso de bebidas alcoólicas ou fumo, durante o tratamento com este medicamento.

#### **Exames laboratoriais**

Não foram observadas alterações em exames laboratoriais, com o uso do ácido tranexâmico.

#### **Alimentos**

O efeito e a eliminação de Transamin<sup>®</sup> injetável não são modificados pela alimentação.

**Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.**

**Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.**

#### **5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?**

Transamin<sup>®</sup> injetável deve ser armazenado na sua embalagem original, em temperatura ambiente (de 15°C a 30°C). Proteger da luz e umidade.

**Número do lote, data de fabricação e prazo de validade: vide embalagem externa.**

**Não use medicamento com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.**

#### **Características físicas e organolépticas**

Transamin injetável é um líquido límpido incolor, livre de partículas estranhas.

**Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.**

**Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.**

**Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.**

## **6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Modo de Uso: Transamin<sup>®</sup> injetável só deve ser aplicado pela via endovenosa, isto é, na veia, por profissionais de saúde, em ambiente hospitalar e sob supervisão médica.

Posologia: A dose de Transamin<sup>®</sup> injetável será receitada pelo seu médico, de acordo com a sua necessidade.

**Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento.**

**Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.**

## **7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?**

Transamin<sup>®</sup> injetável deve ser aplicado por profissionais de saúde, em ambiente hospitalar e na dose e horários receitados pelo seu médico.

## **8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?**

### **Reações adversas**

De modo geral, Transamin<sup>®</sup> injetável é bem tolerado. Entretanto, só deve ser aplicado pela via endovenosa, isto é, na veia. Não deve ser aplicado pela via intramuscular, pois pode causar lesão no músculo. Quando Transamin<sup>®</sup> injetável é aplicado na veia rapidamente, pode causar náuseas, vômitos, queda da pressão ou diminuição dos batimentos do coração.

Outras reações adversas observadas com o uso do ácido tranexâmico pela via endovenosa foram:

Reações comuns (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento): náuseas\* e vômitos\*.

Reações incomuns (ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento): alergia na pele.

Reações raras (ocorre entre 0,01% e 0,1% dos pacientes que utilizam este medicamento): tonteira\*, dor de cabeça\*, visão embaçada\*, queda da pressão\* e tromboembolismo\*. Em tratamentos por períodos longos, foi observada, também, dificuldade para identificação das cores\*\*.

(\*) Estas reações adversas aconteceram com o uso de doses mais altas do ácido tranexâmico e desapareceram com a diminuição da dose.

**(\*\*) Informe imediatamente ao seu médico o aparecimento de dificuldade para identificação das cores, pois, nestes casos, o medicamento deve ser suspenso.**

**Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.**

### **9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?**

Em caso de uso de dose maior do que aquela que lhe foi receitada pelo seu médico, você poderá apresentar náuseas, vômitos, dor no estômago, diarreia, tonteira, dor de cabeça, visão embaçada e queda da pressão. Tente tomar maior quantidade de água, para que maior quantidade do medicamento possa ser eliminada pela urina, e procure seu médico imediatamente.

**Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível.**

**Em caso de intoxicação ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações sobre como proceder.**

### **III-DIZERES LEGAIS**

Registro: 1.5651.0045

#### **Produzido por:**

**HYPOFARMA INSTITUTO DE HYPODERMIA E FARMÁCIA LTDA.**

Rua Dr. Irineu Marcellini 303, São Geraldo. Ribeirão das Neves

CEP: 33805-330, Minas Gerais

CNPJ: 17.174.657/0001-78

Indústria Brasileira

#### **Registrado por:**

**ZYDUS NIKKHO FARMACÊUTICA LTDA.**

Av. das Américas, 3434 - bloco 07 - salas 502 e 503 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

CEP: 22.640-102

CNPJ: 05.254.971/0001-81

Serviço de Atendimento ao Consumidor

0800 282 11 27

[www.zydusbrasil.com](http://www.zydusbrasil.com)

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO**

**USO RESTRITA A ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE**



**Esta bula foi aprovada pela Anvisa em 15/06/2026.**



### Histórico de Alteração da Bula

| Dados da Submissão Eletrônica |                                            |                                                                                  | Dados da Petição/Notificação que Altera Bula |                |         | Dados das Alterações de Bulas                                                                                                      |                  |                                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data do Expediente            | No. Expediente                             | Assunto                                                                          | Data do Expediente                           | No. Expediente | Assunto | Itens de Bula                                                                                                                      | Versões (VP/VPS) | Apresentações relacionadas                                                                                       |
| 15/06/2026                    | Será disponibilizado após o peticionamento | 10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12 | -                                            | -              | -       | VP:<br>4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?<br><br>VPS:<br>5. ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES<br><br>Dizeres Legais       | VP/VPS           | 50 MG/ML<br>SOL INJ CT 5<br>AMP VD<br>TRANS X 5<br>ML<br>50 MG/ML<br>SOL INJ CT<br>100 AMP VD<br>TRANS X 5<br>ML |
| 17/11/2023                    | 1277973237                                 | 10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12 | -                                            | -              | -       | VP/VPS:<br>Apresentações                                                                                                           | VP/VPS           | 50 MG/ML<br>SOL INJ CT<br>100 AMP VD<br>TRANS X 5<br>ML                                                          |
| 24/11/2022                    | 4979007228                                 | 10451 - MEDICAMENTO NOVO - Notificação de Alteração de Texto de Bula – RDC 60/12 | -                                            | -              | -       | VP:<br>5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?<br><br>VPS:<br>7. CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO | VP/VPS           | 50 MG/ML<br>SOL INJ CT 5<br>AMP VD<br>TRANS X 5<br>ML                                                            |

|            |              |                                                                                                     |   |   |   |                                                             |        |                                                       |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|
| 09/08/2022 | 4525576227   | 10451 -<br>MEDICAME<br>NTO NOVO -<br>Notificação de<br>Alteração de<br>Texto de Bula<br>– RDC 60/12 | - | - | - | III – DIZERES LEGAIS                                        | VP/VPS | 50 MG/ML<br>SOL INJ CT 5<br>AMP VD<br>TRANS X 5<br>ML |
| 24/04/2022 | 1573014210   | 10451 -<br>MEDICAME<br>NTO NOVO -<br>Notificação de<br>Alteração de<br>Texto de Bula<br>– RDC 60/12 | - | - | - | III – DIZERES LEGAIS                                        | VP     | 50 MG/ML<br>SOL INJ CT 5<br>AMP VD<br>TRANS X 5<br>ML |
| 20/03/2019 | 0251775/19-2 | 10451 -<br>MEDICAME<br>NTO NOVO -<br>Notificação de<br>Alteração de<br>Texto de Bula<br>– RDC 60/12 | - | - | - | III – DIZERES LEGAIS                                        | VP/VPS | 50 MG/ML<br>SOL INJ CT 5<br>AMP VD<br>TRANS X 5<br>ML |
| 01/11/2018 | 1053142/18-4 | 10451 -<br>MEDICAME<br>NTO NOVO -<br>Notificação de<br>Alteração de<br>Texto de Bula<br>– RDC 60/12 | - | - | - | I – IDENTIFICAÇÃO DO<br>MEDICAMENTO<br>III – DIZERES LEGAIS | VP/VPS | 50 MG/ML<br>SOL INJ CT 5<br>AMP VD<br>TRANS X 5<br>ML |

|            |            |                                                                                        |            |              |                                                                                                                                                      |                |        |                                                                                                                      |
|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -          | -          | 10451 –<br>NOVO -<br>Notificação<br>de Alteração<br>de Texto de<br>Bula – RDC<br>60/12 | 23/05/2017 | 0970128/17-1 | 10246 –<br>MEDICAMENT<br>O NOVO –<br>Alteração de local<br>de fabricação do<br>medicamento de<br>liberação<br>convencional com<br>o prazo de análise | DIZERES LEGAIS | VP/VPS | 50 MG/ML<br>SOL INJ CT 5<br>AMP VD<br>TRANS X 5<br>ML                                                                |
| 08/11/2013 | 0931117133 | 10458 - NOVO<br>- Inclusão<br>Inicial de<br>Texto de Bula<br>– RDC 60/12               | -          | -            | -                                                                                                                                                    | VERSÃO INICIAL | VP/VPS | 250 MG COM<br>CT STR X 12<br><br>250 MG COM<br>CT STR X 24<br><br>50 MG/ML SOL<br>INJ CT 5 AMP<br>VD TRANS X 5<br>ML |