



MAYCOURI
(diosmina + hesperidina)

Sanusphar Pesquisa e Desenvolvimento Ltda

Granulado para suspensão oral
900 mg + 100 mg



BULA PARA PACIENTE

Bula de acordo com a Resolução-RDC nº 47/2009

I- IDENTIFICAÇÃO DO MEDICAMENTO

MAYCOURI

diosmina + hesperidina

APRESENTAÇÕES

Granulado 900 mg + 100 mg (sabor laranja/limão): embalagens com 10 e 30 sachês de 5g.

USO ORAL USO ADULTO

COMPOSIÇÃO

MAYCOURI sabor laranja/limão:

Cada sachê de MAYCOURI contém:

diosmina.....	900 mg
hesperidina (correspondente à fração flavonoica purificada micronizada, contendo 90% a 102% de hesperidina)	
.....	100 mg

Excipientes: manitol, dióxido de silício, ácido cítrico, sorbitol, sacarina sódica, sucralose, aroma natural de limão e aroma de laranja.

II- INFORMAÇÕES AO PACIENTE

1. PARA QUE ESTE MEDICAMENTO É INDICADO?

MAYCOURI é indicado no tratamento sintomático das varizes e de outros sintomas relacionados à insuficiência vascular crônica como dor nas pernas, sensação de queimação e inchaços.

2. COMO ESTE MEDICAMENTO FUNCIONA?

MAYCOURI atua no sistema vascular, aumentando a velocidade de circulação do sangue nas veias, normalizando a permeabilidade capilar e reforçando a resistência capilar na microcirculação e aumentando a drenagem linfática. Toda essa ação leva a uma melhora dos sintomas relacionados à insuficiência venosa crônica dos membros inferiores. A ação de MAYCOURI também é responsável por atenuar a intensidade da dor, reduzir e acelerar a reabsorção dos hematomas e edemas e melhorar os sintomas relacionados à doença venosa crônica (sensação de pernas pesadas, fadiga dos membros inferiores, câimbras).

Melhora dos sintomas, em média, após aproximadamente 14 dias de tratamento.

3. QUANDO NÃO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Embora não se conheça, até o momento, nenhuma contraindicação absoluta para o uso de MAYCOURI, o mesmo deve ser evitado em pacientes que apresentem reações alérgicas a quaisquer componentes da sua formulação.

MAYCOURI não deve ser utilizado em crianças e adolescentes (com idade inferior a 18 anos).

4. O QUE DEVO SABER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Não há, até o momento, dados sobre o uso de MAYCOURI em portadores de insuficiência hepática ou renal. Caso você tenha antecedente ou esteja em tratamento por doenças que afetam os rins e o fígado, avise seu médico antes de iniciar o tratamento com este medicamento.

Os estudos realizados em animais de laboratório não demonstraram toxicidade em relação às funções de reprodução. Ainda assim, o uso de MAYCOURI em gestantes e lactantes deverá ser cauteloso, considerando risco-benefício.

Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação do médico ou do cirurgião-dentista.

Não há relatos de interações medicamentosas com as substâncias ativas do produto MAYCOURI. Não há referências a restrições de uso do produto junto com alimentos. Não há informação sobre alterações de exames laboratoriais pelas substâncias ativas deste medicamento.

Contém sorbitol, sucralose e sacarina sódica (edulcorantes).

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Não use medicamento sem o conhecimento do seu médico. Pode ser perigoso para a sua saúde.

5. ONDE, COMO E POR QUANTO TEMPO POSSO GUARDAR ESTE MEDICAMENTO?

Armazenar em temperatura ambiente (entre 15 e 30°C). Proteger do calor.

Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Características físicas e organolépticas

MAYCOURI sabor laranja/limão: granulados de coloração bege escuro e aroma de laranja/limão.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo.

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.

6. COMO DEVO USAR ESTE MEDICAMENTO?

Você deve usar MAYCOURI apenas sob a orientação médica. A via de administração de MAYCOURI é oral.

MAYCOURI deve ser dispersado em 1 copo com aproximadamente 250 ml de água em temperatura ambiente, misturado com o auxílio de uma colher e ingerido logo em seguida. O produto em água formará uma suspensão de coloração bege.

Após a diluição do conteúdo de 1 sachê em aproximadamente 250 mL de água, a suspensão oral resultante apresenta concentração aproximada de 3,6 mg/mL de diosmina e 0,4 mg/mL de hesperidina.

Nos quadros de varizes e de sintomas relacionados à insuficiência venosa, a posologia usual de MAYCOURI é de 1 sachê ao dia, de preferência pela manhã.

O uso de MAYCOURI por via de administração não recomendada pode acarretar riscos de reações desagradáveis e falta de efeito clínico.

Siga a orientação de seu médico, respeitando sempre os horários, as doses e a duração do tratamento. Não interrompa o tratamento sem o conhecimento do seu médico.

7. O QUE DEVO FAZER QUANDO EU ME ESQUECER DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Caso você esqueça de tomar uma das doses de MAYCOURI, deverá fazer uso da mesma assim que se lembrar, exceto nos casos em que o horário da próxima dose já esteja muito próximo. Em nenhuma hipótese a dose de MAYCOURI deve ser dobrada em caso de esquecimento de uma das tomadas.

Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico, ou cirurgião-dentista.

8. QUAIS OS MALES QUE ESTE MEDICAMENTO PODE ME CAUSAR?

Raramente ocorrem reações desagradáveis com o uso de MAYCOURI. No entanto, a administração do produto poderá ocasionar reações comuns (ocorre entre 1% e 10% dos pacientes que utilizam este medicamento) como: cefaleia (dor de cabeça), náuseas, dor abdominal, dispepsia, diarreia, insônia, sonolência e mialgia (dor nos músculos).

A literatura cita ainda as seguintes reações adversas, sem frequência conhecida: cansaço, vômito, dor epigástrica e alterações na pele.

Existem casos relatados de eczema (doença de pele na qual surgem lesões sob forma de placas, manchas ou bolhas) e pitíriase rósea após administração oral de formulações contendo diosmina e hesperidina. Esses efeitos, porém, regredem completamente após descontinuação da medicação.

Foram relatados ainda sintomas como tontura, vertigem, ansiedade e fadiga ao tratamento com diosmina e hesperidina.



Informe ao seu médico, cirurgião-dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também à empresa através do seu serviço de atendimento.

9. O QUE FAZER SE ALGUÉM USAR UMA QUANTIDADE MAIOR DO QUE A INDICADA DESTE MEDICAMENTO?

Não há relatos de superdosagem com MAYCOURI.

Caso isso ocorra, procure imediatamente um serviço médico de emergência e informe, se possível, o número de doses tomadas e o horário. Baseado no perfil de efeitos adversos observados em doses habituais é possível que ocorram manifestações gastrointestinais mais intensas como náuseas, vômitos, dor abdominal, diarreia e cefaleia.

Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

III- DIZERES LEGAIS

Registro: 1.3845.0008



Importado e registrado por:

Sanusphar Pesquisa e Desenvolvimento Ltda

Rua Professor Valdecir Campestre, 233, Jardim Olímpia, Vargem Grande Paulista, SP - CEP: 06730-000
CNPJ 36.130.126/0001-28

Produzido por:

XL Laboratories

E-1223, Phase-1 Extn. (Ghatal), RIICO INDUSTRIAL AREA, Bhiwadi-301019,
Rajasthan. India

VENDA SOB PRESCRIÇÃO

Histórico de Alterações da Bula

Dados da submissão eletrônica			Dados da petição/notificação que altera a bula				Dados das alterações de bulas		
Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data do expediente	Nº do expediente	Assunto	Data de aprovação	Itens de bula	Versões (VP/VPS)	Apresentações relacionadas
NA	Gerado no momento do protocolo	10461 - ESPECÍFICO - Inclusão Inicial de Texto de Bula – publicação no Bulário RDC 60/12	NA	NA	NA	NA	Inclusão de Bula no Bulário Eletrônico da ANVISA em adequação à Bula Padrão.	VP/VPS	(900 + 100) MG GRAN SUS OR CT 10 ENV AL/PAP X 5G (SABOR LARANJA/LIMÃO) (900 + 100) MG GRAN SUS OR CT 30 ENV AL/PAP X 5G (SABOR LARANJA/LIMÃO)